



FERTILIZANTE-BIOESTIMULANTE FOLIAR LÍQUIDO

NOMBRE COMERCIAL: BIOMI-PLUS

INGREDIENTE ACTIVO: Aminoácidos, Algas Marinas y Ácidos Fúlvicos.

FORMULACIÓN: Líquido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Color: Negro; Densidad: 1.07-1.012 g/ml; pH: 5-5.5

COMPOSICIÓN	
Aminoácidos	15.00 %
Algas marinas	10.00 %
Ácidos fúlvicos	10.00 %
Nitrógeno	5.00 %
Potasio	8.00 %
Micronutrientes (Cu+Fe+Co+Zn+Mg+ca)	3.22 %
Acondicionadores y Estabilizadores	48.78 %

PRINCIPALES CARACTERISTICAS.

BIOMI-PLUS es un fertilizante-bioestimulante foliar con alto contenido de aminoácidos, algas marinas y ácidos fúlvicos, recomendado en los cultivos que tienen requerimientos mayores de estos elementos. Gracias a su formulación se facilita la absorción, asimilación y sirve para prevenir el estrés hídrico (biótico y abiótico). Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo.

BENEFICIOS.

- Previene el estrés hídrico.
- Promueve un fuerte crecimiento temprano.
- Mantiene el crecimiento vegetal y maximiza la cantidad de rebrotes.
- Aumenta el tamaño, peso y los grados brix de la fruta.
- Estimula el crecimiento de las células vegetales.

RECOMENDACIONES DE USO.

Calibre su equipo de aplicación y agite **BIOMI-PLUS** antes de usarse. No se recomienda usar cuando el cultivo presenta enfermedades fúngicas o bacterianas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN.

Cultivo	Dosis en vía foliar	Observaciones
Frutales verdes aguacate, cítricos, durazno, guayabo, mango, manzano, pera.	2-3 L/ha	Puede aplicarse en prefloración, en caída de pétalos, en post-cuajado y en engorde de fruto.

Hortalizas Ajo, calabaza, cebolla, melón, pepino, sandía, tomate y chile de invernadero.	1-2 L/ha	Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 20 días.
Sorgo, arroz, avena, maíz, trigo, caña de azúcar.	1-2 L/ ha	Aplicar en inicio de espigado, antes de la polinización, en maíz en la hoja V4 a V5, en trigo en el primer nudo.
Plátano, papaya, piña,	1-2/ha	Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 20 días.
Arándano, fresa, frambuesa, vid, zarzamora	1-2 L/ha	Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 días.
Piña	1-2 L/ha	Aplicar a los 40 días después de la inducción y repetir a los 90 a 100 días después de la inducción.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Se aplica en vía foliar a través del agua

ADVERTENCIAS DEL USO

Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, guantes, mascarilla). Evite su contacto directo con los ojos y piel.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos y en caso de ingestión consulte a su médico llevando la etiqueta del producto.

Medidas de protección al ambiente: disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya vida marina o en fuentes que se utilicen para consumo humano o animal.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis, etapas y formas de aplicación recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

BIOMI-PLUS es compatible con la mayoría de los fertilizantes, sin embargo, se debe de hacer unas pruebas de compatibilidad en cantidades mínimas antes de su uso.

Edición: Junio 2024.

Esta ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.